

## Gamay Teinturier

### Extraits bibliographiques :

« Le Rouge de Bouze est si bien un Gamay que, durant tout le cours de sa végétation, il ne se distingue du Gamay type ni par son feuillage, ni par son fruit. »

Extrait l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901



« Son principal avantage cultural est, avec une fertilité supérieure à celle de beaucoup de Gamays fins, la faculté précieuse de redonner, après les gelées de printemps, une récolte appréciable. »

Extrait de l'Ampélographie, Tome 2, Viala et Vermorel, 1901

## Description bibliographique



Le Gamay de Bouze est le plus ancien des Gamays teinturiers connus et il est le père de tous les autres, mais son origine est inconnue, peut-être une variation de bourgeon pour Pulliat, mutation apparue sur une souche de Gamay Noir ou semis, pour Roy-Chevrier, d'un croisement naturel entre le Gamay et le Teinturier du Cher.

Jeunes feuilles aranéuses, très cuivrées, presque rouges. Le feuillage rougit à l'automne, tandis que les grappes vertes ne commencent à se colorer que quelques jours avant la véraison.

Les grappes sont moyennes, cylindriques, baie petite, ovoïde, noir bleuté à jus rosé, peu coloré.

## Synonymes

Rouge de Bouze, Plant de Bouze, Plant Rouge de Bouze, Rouge de Couchey, Mourot, Petit Mourot, Mourot de Russilly, Gamay Mourot, Moureau, Mouraud, Le Teinturier



# GAMAY DE BOUZE

Le Gamay de Bouze du conservatoire :

Il provient de la collection de l'INRA de Vassal

## *Fiche en cours d'élaboration*

Cette fiche sera complétée avec les observations effectuées sur la parcelle du conservatoire