

Probablement la mutation noire
du Gouais blanc (d'après les
analyses ADN)

Extraits bibliographiques :

« C'était le cépage principal du vignoble montluçonnais (Domérat Huriel) et on le rencontrait secondairement un peu dans le Cher à Châteaumeillant et sur les bords de l'Indre. [...] Sa culture est donc en recul, passant de 739ha en 1958 à 4ha en 1988 et 9,6ha en 2011 dans l'Allier. »

Extrait du Dictionnaire encyclopédique des cépages, Pierre Galet, édition 2015



« Jamais ce cépage n'aurait été délaissé sans son défaut de maturité et sa prédisposition à la pourriture. Il n'est pas rare de trouver sur la même grappe des grains mûrs, des grains verts et des grains pourris. »

Extrait de l'Ampélographie, Tome 5, Viala et Vermorel, 1904

Description bibliographique



Cépage de cuve rouge.

Bourgeonnement aranéeux, vert jaunâtre. Jeunes feuilles aranéeuses, jaunâtres à plages bronzées. Rameaux côtelés, vert brunâtres, ternes, nœuds faiblement rosés ; vrilles moyennes, charnues, jaunes pâles. Grappes petites à moyennes, cylindriques, compactes, souvent ailées ; baies sphériques ou ovoïdes, moyennes, noires.

Très sensibles aux gelées de printemps et à la pourriture grise.

Il donne un vin peu coloré, acide, ordinaire.

Nous avons choisi de l'ajouter à la collection car il a été cultivé (anecdotiquement certainement) dans la Nièvre (2 ha en 1958) d'après P. Galet dans «Cépages et vignobles de France», 1990.

Crédits photos : Pl@ntGrape,
le catalogue des vignes cultivées
en France, © UMT Géno-Vigne®,
INRA – IFV – Montpellier SupAgro
2009-2011

Synonymes

Gouge noir, Gauget noir, Gouge, Lyonnais.



GOUGET NOIR

Le Gouget noir du conservatoire :

Nous ne l'avons pas pour le moment.

Fiche en cours d'élaboration

Cette fiche sera complétée avec les observations effectuées sur la parcelle du conservatoire